



Autores:

Socolsky G (*); - López Galíndez A(**); Rocha D. (***) ; Rocha Ma. R. (***) ; Capoulat C. (***) .

Diagnósticos Gamma:

- (*) Director de Residencia Médica.

- (**) Médico de Staff.

- (***) Residentes.

- Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de interés.

-Tucumán, Argentina. rochacossio2019gmail.com

Presentación del caso:

El objetivo de nuestro trabajo fue describir el caso de una paciente, 52 años de edad, presentaba vértigo, síncope, disnea, temblores y papitaciones a repetición. Con antecedentes de hipertensión, trastornos de ansiedad generalizada , controlada y medicada.

En febrero de 2025, se realizó de control en Diagnósticos Gamma, una Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de Cerebro con contraste, sin estudios previos en la institución. Se efectuó en Resonador Philips 3 Tesla, cortes axiales, coronales y sagitales, en secuencias T1, T2, STIR y DWI.

Discusión

La paciente presentó sintomatología ya descrita anteriormente sin cambios con los estudios previos, mostrando secuelas de múltiples focos isquémicos sin aparición de alguno nuevo o sangrado activo. (Fig. Nº 1 y 2), observándose además un hallazgo incidental de múltiples quistes en el hipocampo (Fig,. Nº 3 y 4), lo cual llevó a pensar en los siguientes diagnósticos: 1) Quiste remanente del surco hipocampal 2) Esclerosis Temporal Mesial 3) Quiste Aracnoideo.

Respecto a los quistes remanentes del surco hipocampal son una variación anatómica, se forman por defectos de fusión del asta de Amón con la circunvolución dentada condicionan la formación de quistes en el surco del hipocampo durante la vida embrionaria. No provocan síntomas, son hallazgos incidentales.


Conclusión

Los hallazgos radiológicos pueden corresponder a Quistes remanentes del surco hipocampal, por no presentar síntomas nuevos o antecedentes patológicos de la infancia. Mostrando una aparente collar de perlas en la zona de hipocampo.

Bibliografía


vista de el hipocampo: revisión de su anatomía y patologías más frecuentes . (s/f). espacio-seram.com. recuperado el 9 de junio de 2025
ortega, ma, vela, j., muñiz, c., nieto, jg, martín, av, & gil, jgs (2014). estudio del hipocampo con rm: anatomía normal, variantes de la normalidad y patología .
garcía, asg, garcía, im, rico, rdt, terrón, emm, gordo, ed, del pilar cerda riche., m., & de zamora., ca (s/f). lesiones quísticas congénitas cerebrales: hallazgos en tc y rm . cenara2023.org.

Hallazgos imagenológicos



- Fig. Nº1 - FLAIR sagital- , - Fig. Nº 2 DWI axial.

RMN de cerebro: Muestran múltiples imágenes hiperintensas (Fig.Nº1) en ambos hemisferios cerebrales en forma difusas, en Fig. Nº2 sin restriccion , ambos correspondiente focos isquémicos crónicos con predominio frontal.



- Fig. Nº3 – T2 axial , - Fig. Nº 3 FLAIR Sagital.

RMN de cerebro: presenta múltiples imágenes pequeñas hiperintensa en borde lateral del hipocampo en forma “collar de perlas”.