

Arévalo Analuz, Muñoz Ferragut Maria Florencia, Gramaglia Lucila, Boixadera Maria José, Pelizzari Mario
Clínica Universitaria Reina Fabiola, Córdoba – Argentina

Sin conflicto de intereses


Presentación de casos

- 1: F. 8m. Sin antecedentes. Lesión cutánea perianal, rosada, de forma triangular.
- 2: F.11m. Antecedentes: constipación. Tumoración perianal intermitente, luego de la defecación. Leve eritema local.
- 3: M. 6m. Sin antecedentes. Sobre elevación cutánea perianal de aspecto vascular, hallada en control médico.

Hallazgos imagenológicos (ecografía)

- 1: estructura polipoidea isoecogénica, dermohipodérmica, con vascularización central al Doppler.
- 2: estructura de aspecto polipoideo, con vascularización central al Doppler.
- 3: imagen focal hipoecogénica sobre elevada, con vascularización al Doppler de tipo arterial de baja resistencia, venosa y también con fístulas.

Las lesiones remitieron espontáneamente a los pocos meses, y el caso 2, tras el tratamiento de la constipación.



Discusión

La protrusión piramidal perianal infantil (PPPI) del lactante es una lesión benigna, relativamente frecuente y subdiagnosticada. Es una lesión cutánea que protruye en la línea media anterior o posterior al ano. Más frecuente en mujeres. Clínicamente: protrusión de la piel de forma triangular, color rosado o rojo pálido, superficie lisa y consistencia duroelástica. Excepcionalmente múltiple. Se reconocen tres variantes de la lesión:

Congénita: por debilidad del piso pélvico o por un remanente de una punta proyectada del septo urogenital. Pueden detectarse casos familiares. Adquirida: relacionada con estreñimiento, diarrea, fisuras y fístulas. Asociada a liquen escleroatrófico.

Debe diferenciarse de: condiloma acuminado, malformación vascular, abuso sexual, lesiones granulomatosas de enfermedades inflamatorias intestinales, hemorroides y prolapso rectal. La ecografía es el método complementario de elección para su diagnóstico y seguimiento, donde se evidencia imagen hipo o isoecogénica, de origen dérmico, con vascularización central al examen Doppler. Su pronóstico es excelente, con resolución espontánea y ad integrum.

Conclusión

La PPPI es una lesión frecuente que incluye, entre sus diagnósticos diferenciales, otras patologías de implicancia médico-social, por lo que su sospecha y seguimiento son cruciales.

Bibliografía

Lamberti A, Filippou G, Adinolfi A, Fimiani M, Rubegni P. Infantile perianal pyramidal protrusion: a case report with dermoscopy and ultrasound findings. Dermatol Pract Concept. 2015 Apr 30;5(2):125-8. doi: 10.5826/dpc.0502a25. PMID: 26114069; PMCID: PMC4462916.