


"ESCROTO DOLOROSO, TESTÍCULO NORMAL: DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE UNA DEFERENTITIS AGUDA AISLADA"


Autores: Bejarano MJ, De Lima Borges Abrantes DW, San Gregorio M, Jaimez AR, Martinez GE
Sanatorio Juan XXIII, General Roca, Río Negro. Argentina *Los autores declaran no tener conflicto de interés*

Presentación del caso:


Paciente de 32 años consulta por dolor escrotal derecho de tres días de evolución. Se presenta afebril y sin síntomas urinarios. Al examen físico se evidencia escroto derecho eritematoso y doloroso a la palpación. El laboratorio muestra leucocitosis con neutrofilia y plaquetas elevadas, compatibles con proceso inflamatorio agudo. Se realiza ecografía escrotal con Doppler color con los siguientes hallazgos imagenológicos:




Testículo de ecogenicidad y vascularización conservadas



Epidídimo de ecogenicidad conservada



Conducto deferente engrosado e hipoeicoico



Hipervascularización

Discusión

La deferentitis es inusual como hallazgo aislado. Su detección requiere una evaluación dirigida del cordón espermático y diferenciación con otras causas de dolor escrotal. En este caso, la evaluación ecográfica permitió identificar la causa del cuadro clínico, posibilitar el diagnóstico y orientar una conducta adecuada sin necesidad de intervenciones invasivas.

Conclusión

La deferentitis debe ser considerada como diagnóstico diferencial en dolor escrotal agudo con ecografía testicular normal.

Bibliografía

- Yang, D. M. et al. (2010). Sonographic findings of acute vasitis. J Ultrasound Med, 29(12), 1711–1715. <https://doi.org/10.7863/jum.2010.29.12.1711>
- Turgut, A. T. et al. (2007). Diseases of the scrotum: ultrasonographic findings. J Clin Ultrasound, 35(8), 445–457. <https://doi.org/10.1002/jcu.20375>
- Radiopaedia.org. (2024). Vasitis. Recuperado de <https://radiopaedia.org/articles/vasitis>