



MIXOMA INTRAMUSCULAR DE GLÚTEO IZQUIERDO A PROPÓSITO DE UN CASO

AUTORES: Salomón Londoño, Gonzalo Morel, Julieth Salas, Pilar Remersano, Enrique Lucas

AFILIACIÓN: Hospital de agudos Dr Ignacio Pirovano

PRESENTACIÓN DE CASO: Femenina de 52 años remitida de su centro de atención primaria para valoración de una tumoración en cara antero interna de muslo izquierdo de 1 año de evolución, A la exploración física presentó una tumoración indolora de 12 cm en cara medial y proximal del glúteo izquierdo, sin adherencias a la piel ni adenopatías. Refirió aumento de tamaño en los últimos meses.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS:

TC: Se observó formación de densidad grasa en el espesor del músculo glúteo medio izquierdo con extensión aparente hacia pelvis ocasionando desplazamiento lateral de estructuras de aproximadamente 127 x 141 mm.

DISCUSIÓN: Es un raro tumor benigno de tejidos blandos, de origen mesenquimal, generalmente asintomático, de crecimiento lento que habitualmente se presenta como masa indolora, firme y móvil, entre la 4ta y 7ma década de vida.

Se localiza, en los grupos musculares largos de las extremidades casi la mitad de ellos los encontramos en el muslo, La radiología convencional suele ser normal, mediante US masa hiperecoica, bien definida, con ecos internos de aspecto estriado debido a interdigitaciones de tejido muscular. Suele mostrar hallazgos característicos en la TAC y RMN, incluyendo localización intramuscular, bordes de tejido similar a la grasa y alto contenido en agua. De este modo, se presenta atenuado en TAC, con baja señal en T1 e hiperintenso en T2.

CONCLUSIÓN: Los tumores adiposos son los más frecuentes del grupo de tumores mesenquimales debido a la elevada incidencia de los lipomas. Estas lesiones no son difíciles de ver por los diferentes métodos diagnósticos y el papel del especialista en imágenes deber ser la detección, diagnóstico, estadificación, siendo la exéresis su tratamiento.


CONFLICTO DE INTERÉS: No se evidenciaron conflictos de interés.

BIBLIOGRAFÍA:

- López-Tomassetti Fernández, E. M., Hernández, J. R. H., Esparragon, J. C., García, A. T., & Jorge, V. N. (2012). Intermuscular lipoma of the gluteus muscles compressing the sciatic nerve: an inverted sciatic hernia: Case report. *Journal of Neurosurgery*, 117(4), 795–799.
- Lipoma intramuscular profundo. Reporte de caso. Dr. Ángel Cabezas Román, IR Martín Samaniego, Dr. Esteban Holguín, Dr. Carlos Ballesteros. MetroCiencia 2015.



TC de pelvis: Se observa imagen hipodensa intramuscular en glúteo mayor izquierdo.



TC de pelvis: Presencia de desplazamiento de estructuras pelvianas de la línea media.