

LESIÓN BENIGNA INFRECLENTE DE MAMA: PASH, REPORTE DE UN CASO

Autores: Mendivil, Maria Julieta - Biglia, Florencia - Goyena, Camila - Spada, Valeria - Melis, Mariana - Barrera, Flavia.

SIN CONFLICTO DE INTERÉS

Autor responsable: Mendivil, Maria Julieta. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. dra.mendiviljulieta@gmail.com

Presentación del caso

Paciente femenina de 37 años consulta por palpación de un nódulo en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda, próximo a la región axilar. Se solicita ecografía y mamografía.




Imagen 1: Mamografías comparativas del 2021 y 2023 donde se muestra la asimetría en desarrollo en cola axilar izquierda.




Imagen 3: Tomosíntesis que muestra la falta de disgregación de la asimetría que permanece visible en los distintos cortes.

Conclusión

Si bien la PASH es una entidad poco frecuente y sus características por imagen son inespecíficas, es necesario conocerla para así poder sospecharla, guiar su diagnóstico y no realizar procedimientos quirúrgicos innecesarios.

Bibliografía

- Samardar P, de Paredes ES, Grimes MM, Wilson JD. Focal asymmetric densities seen at mammography: US and pathologic correlation. RadioGraphics 2002;22(1):19-33.
- Navas Cañete, A., Olcoz Monreal, F. J., García Laborda, E., & Pérez Aznar, J. M. (2007). Hiperplasia pseudoangiomatosa estromal: hallazgos en resonancia magnética de dos casos. Radiología, 49(4), 275-278.

Hallazgos imagenológicos

En la mamografía comparativa se evidencia asimetría en desarrollo en cola axilar izquierda. Se completa con tomosíntesis en donde se observa que la asimetría no disgrega en los distintos cortes, y por último, con ecografía en donde se identifica un foco de tejido glandular con patrón ductal aumentado coincidente con el hallazgo radiológico. Se categoriza como BI-RADS 4, por lo que se realiza biopsia core, con resultado de hiperplasia estromal pseudoangiomatosa.




Imagen 2: Ecografía mamaria en donde se muestra en cuadrante superoexterno izquierdo un foco nodular de tejido glandular con patrón ductal aumentado.

Discusión

La hiperplasia estromal pseudoangiomatosa (PASH) es una lesión benigna y relativamente poco frecuente de la mama que se caracteriza por un sobrecrecimiento de tejido conectivo fibroso, sin potencial maligno.

La presentación clínica más frecuente es como nódulo palpable. También puede ser silente y aparecer de forma incidental en biopsias por otras causas.

Las características por imagen son muy inespecíficas, aunque por lo general se presenta como una imagen nodular que remeda a un fibroadenoma, requiriendo biopsia para su diagnóstico final. Menos frecuentemente se presenta como una asimetría en mamografía.

En su mayoría no requieren tratamiento, pero si la masa crece o causa molestias se puede realizar una extirpación quirúrgica.