



SEMINOMA CLÁSICO COMO TUMOR TESTICULAR MÁS FRECUENTE

AUTORES: Badillo Melissa; Alcívar Elizabeth; Castro Bayron; Gómez Luisa; Palermo Javier.

AFILIACIÓN: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano

PRESENTACIÓN DEL CASO:

Masculino de 30 años, sin antecedentes personales, refiere dolor testicular derecho de 6 meses de evolución, niega traumatismo.

DISCUSIÓN:

El seminoma clásico, es el tumor testicular de células germinales más frecuente.

Por medio de ecografía presenta: imágenes hipoecoicas homogéneas.

Es recomendable complementar con tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM).


CONCLUSIÓN:

La ecografía testicular presenta una alta sensibilidad y especificidad en la identificación de masas testiculares, además de ser un método accesible y no invasivo.


Mediante el análisis de las características ecográficas, es posible realizar una aproximación preliminar del tipo de tumor testicular.

Esta evaluación puede complementarse con estudios de imagen adicionales, como TC o RM para una estadificación adecuada y planificación terapéutica.

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS:



Ecografía testicular: Parénquima de ecoestructura heterogénea a expensas de imágenes nodulares hipoecoicas, sólidas, una de contornos regulares y la otra de bordes lobulados y parcialmente definido.



Ecografía doppler testicular: Ambas lesiones presentan vascularización intra y perinodular.

CONFLICTO DE INTERÉS: No se ha identificado ningún conflicto de interés.

BIBLIOGRAFÍA:

- Huertas, C. M., Mellado, R. M., Muñoz, A. M., Rosa, I. C. V., Coronel, V. J., & Gallardo, M. G. (2018). Estudio ecográfico de los tumores testiculares. *Seram*.
- Alonso-Que, H. T., Castillo-Urbe, L., & Rivas-López, A. (2019). Revisión de los patrones ecográficos de los tumores testiculares germinales más frecuentes. *Revista Anales de Radiología México*, 17(3).